

Diagnoser

Infektionskliniken

Observera att koderna i vår lathund är de mest vanligt förekommande koderna som används på en infektionsklinik – på andra kliniker kan vissa av koderna behöva specificeras.

Asterisk * ska stå först, kan ej stå själv.

Dagger † ska hänga på Asteriskkoden, kan stå själv.

Eventuell åtgärd hängs på Asteriskkod.

- Se slutet i häftet för mer info.

A	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Abscess	I skalle/rygggradskanalen/epiduralabscess	G06.	
	Intrakraniell och intraspinal tuberkulös	G07.9*	A17.8†
	Bukabscess/akut peritonit	K65.0	+ TJA40 om bukdränage
Aftös stomatit	Blåsor i munnen	K12.0	
Alzheimers demens		F00.9*	G30.9†
Anaplasmos	Ehrlichios – fästingfeber	A79.8	
Antikoagulantia	Kodas inte när antikoagulantia sätts in eller om det är pausat	Z92.1	
Aspergillos		J17.2*	B44.1†
Aspirationspneumoni	Pga. sväljsvårigheter	J69.0	
	Vid aspiration av maginnehåll.	J95.4	
AV-fistel		I77.0	
Avstängd pyelit		N13.6	

B	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Badsårsfeber	Växt av vibrio cholerae eller vibrio vulnificus	L08.8	A41.8 (i blod) A48.8 (i sår)
BCG-infektion		N33.0*+	A18.1† + Y57.9 + ATC-KOD
BOOP (COP)		J84.8	
Borrelios	Neuroborrelios	G01.9*	A69.2†
	Utredning	Symptom	+TAB00 LP
Bronkit	Orsakad av humant metapneumovirus	J20.8	+ B97.8
Bursit	Uns	M71.9	
	Infektiös	M71.1	

C	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
CMV	Kolit	A09.0	+ B25.8
CVK/ CDK, förekomst av	Kvå-kod om den sätts under vårdtillfället) Ej huvuddiagnos.	Z97.8	

D	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Dermatit	Orsakad av läkemedel. Generaliserad/lokaliserad.	L27.0/L27.1	+Y57.9 + ATC eller Y40-Y57.8
Diarré	Ej infektiös uns, övriga se "gastroenterit"	K52.9	
Divertikel i tarmen	Divertikulit	K57.	
DVT (tromboflebit)	Nedre extremiteter	I80.2	
	I anamnesen	Z86.7B	

E	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Efterkontroll	Frisk patient	Z09.8	+ Utläkta sjukdomen
Eftervård	Alltid huvuddiagnos	Z48.8	+ Diagnos som eftervårdas
Encefalit	Herpes simplex	G05.1*	B00.4†
	Zoster	G05.1*	B02.0†
	Tuberkulos	G05.0*	A17.8†
	TBE – encefalit överförd av fästingar	A84.1	
	Virusmeningoencefalit	A86.9	

Endokardit	TTE och TEE ska kodas		
	Akut/subakut infektiös/bakteriell/septisk	I33.0	+B-KOD
	Protesendokardit	T82.6 Y83.1	+ I33.0 + Z95.3/Z95.2
	Aortarotsabscess	I79.1*	I33.0† + I33.0†igen.
	Vid candidainfektion	I39.8*	B37.6†
	Vid TB	I39.8*	A18.8†
	Kronisk (ange utlösande orsak, ex iv missbruk)	I38.9	
ESBL-bärarskap	+ ISOLERING DV091 OCH EV. SCREENING AV028		
	E. Coli	Z22.1	+B96.2 +U82.2
	Klebsiella	Z22.1	+B96.1 +U82.2
	ESBL-A, KLASSISK	Z22.1	+B-KOD +U82.2A
	ESBL-M (ESBL AV (PAMPC-TYP)	Z22.1	+B-KOD +U82.2B
	ESBL-CARBA	Z22.1	+B-KOD +U82.2C
ESBL-infektion	Se slutet av häftet.		
Esofagit		K20.9	

F	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Feber	Läkemedelsutlöst	R50.2	Y57.9 + atc om känt läkemedel
Friskt barn	Tillsammans med inneliggande mor/far	Z76.3	
Fynd på röntgen	Ex. Misstänkt tumör	R90-94	
Förebyggande immunoterapi	Behandling med immunoglobulin	Z29.1	
Förekomst av	Hjärtklaffprotes	Z95.2–4	
	CABG	Z95.1	
	PCI med stent	Z95.5	
	Kärlgraft	Z95.8	
	Nefrostomi/ureterostomi/uretrostomi	Z93.6	
Förhöjt CRP		R70.0	
Förmaksflimmer		I48.	

G	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Gastric bypass, status post		Z98.0	
Gastroenterit	EHEC	A04.3	
	E. coli-enterit	A04.4	
Gonokockinfektion	Ospecificerad	A54.9	
Graviditet - öppenvården	Kodas som bidiagnos. Om patienten är gravid vid besöket.	Z33.9	
Graviditet - slutenvården	Kodas med kod från O-kapitlet och sedan "ordinarie kod". Exempel: En gravid patient har fått en lunginflammation och vårdats på sjukhus. Huvuddiagnos: Sjukdom i andningsorganen hos gravid patient O99.5 Bidiagnos: Bakteriell pneumoni J15.9		

H	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
VAD?			
Hand-foot-mouth disease	Höstblåsor	B08.4	
Hiv		B24.9	
	Provtagning	Z11.4	
	Rådgivning	Z71.7	
	Kontakt med/ exponering för hiv	Z20.6	

Hjärtinfarkt	Akut (inom 28 dagar efter symptomdebut) Specificeras om vi vet vilken typ.	I21.0-9	
	Gammal	I25.2	
Hjärtstillstånd	Framgångsrik HLR, aldrig huvuddiagnos	I46.0	
	Ej framgångsrik HLR, aldrig huvuddiagnos	I46.9 +DF028	
Hundbett infekterat		T79.3	+W54 + L-KOD
Huvudvärk	Efter lumbalpunktion	G97.1	
Hypogammaglobulinemi		D80.1	

I			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Infektion orsakad av:	Hjärtklaffprotes	T82.6	+Y83.8
	Ex CVK, port-a-cath, graft, CDK, PICC-line	T82.7	+Y83.8
Influensa	A/B utan H1N (vanlig influensa)	J10.1	+DV091
	Influensa med pneumoni (inte J10.0)	J10.1	J15.9
	Pneumoni orsakad av influensa	J10.0	
Insektsbett	Giftigt , getingstick, bistick + infektion	T63.4A	+X23+L02
	Icke giftigt (lokal hudinfektion)	T14.0D	+W57+L02

K			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
KAD-bärare kronisk		Z96.0	
Kattbett infekterat	(om pasteurella A28.0)	T79.3	+W55. + L-KOD
KOL	Lungemfysem ingår i diagnosen.	J44.9	
	Med akut exacerbation	J44.1	

L			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Leverabscess	Orsakad av amöba	K77.0*	A06.4†
Leverprover, onormala		R74.9	
Likvorré	Läckage av cerebrospinalvätska	G96.0	
Lungblödning		R04.8	
Lungemboli	Innefattar lunginfarkt	I26.9	
	I den egna sjukhistorien	Z86.7A	
Läkemedelsbiverkan	Koda biverkan som diagnos, se nedan		+Y57.9 + ATC-KOD/ Y40-Y57.8

Y57.9 + ATC-kod är enbart om läkemedlet specificerats, annars väljer man Y40-Y57.8. (INGEN ATC-KOD).

M			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
MBL	Metallobetalaktamas	Z22.3W	+B96.5 +U88.9 +DV091
Mediastinit		J98.5	
Meningit, bakteriell:	Salmonella, ej typhi	G01.9*	A02.2†
	Tuberkulös	G01.9*	A17.0†
Virusmeningit:	Adenovirus	G02.0*	A87.1†
	Enterovirus	G02.0*	A87.0†
	Varicella	G02.0*	B01.0†
	Zoster	G02.0*	B02.1†
	Herpes simplex virus	G02.0*	B00.3†
	Parotitvirus	G02.0*	B26.1†
	Candida	G02.1*	B37.5†

Meningit, annan:	Leptospira	G01.9*	A27.†
	Trypanosomiasis	G02.8*	B56/B57.4†
	Meningokocksepsis	A39.2	
	Meningokockemi, kronisk	A39.3	
MRSA	Kronisk bärare, utan aktuell infektion	Z22.3C	+B95.6 +U82.1
	Med infekterat trycksår	L89.9	+B95.6 +U82.1
	MRSA-screening	Z112.2	AV028
	MRSA-information vid första besök/telefonid	GB009	← ÅTGÄRDSKOD

N			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Neutropen feber	(På grund av cytostatika + Y43.3)	R50.8	+D70.9C
Njursvikt	Prerenal	N17.8	
Nosokomial infektion	(Hänger på huvud-/bidiagnos)	Y95.9	

O			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Obesitas	Fetma, övervikt	E66.9	
Ormbett		T63.0	+X20.99 + L-kod
Osteit/osteomyelit	Kronisk	M86.6	
	Akut osteomyelit	M86.1	+ B-kod
	I ryggkota	M46.2	

P			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Pacemaker	Förekomst av + orsak, ex AV-block III	Z95.0	
Pasteurellos	(Multocida) – vid kattbett	A28.0	
PEG/gastrostomi	Förekomst av	Z93.1	
Pleurit/pleuravätska	Torr	R09.1	
	Exsudativ/sekundär till infektion	J90.9	
Pneumoni, bakteriell:	Legionella (legionärsjuka)	A48.1	
	Ornitos, Chlamydophila psittaci, psittakos, papegojsjuka	J17.8*	A70.9†
	Pertussis	J17.0*	A37.9†
	Salmonella	J17.0*	A02.2†
	Pneumokockpneumoni	J13.9	
	Tyfoid-feber	J17.0*	A01.0†
Pneumoni hos gravid i slutenvård		O99.5	J15.9
Pneumoni, parasitär:	Pneumocystis jiroveci/carinii	J17.2*	B48.5†
	Toxoplasmos	J17.3*	B58.3†
Pneumoni, virus:	Adeno	J12.8	B34.0
	CMV	J17.1*	B25.0†
	Mässling	J17.1*	B05.2†
	Varicellapneumoni	J17.1*	B01.2†
Pneumothorax	Komplikation till medicinskt ingrepp	T81.2 +	S27.0 (traumatisk) + Y60.0
Pontiac-feber	Icke pneumonisk legionella	A48.2	
PrEP	Uppstart av PrEP-behandling	Z20.6	DT026 +ATC
	Rådgivning gällande PrEP-behandling (diagnostexten ändras till detta)	Z70.8	
Protesinfektion	Tidig/sen	T84.5	+Y83.1 / +Y88.3

Psoasabscess		M60.0	TQX05 om punktion
R			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
RS-virus	Akut bronkit orsakad av RS-virus	J20.5	+ smittisolering DV091
Rökare	Tobaksberoende. Innefattar även snusare. Om den tobaksberoende patienten även har en sjukdom (till exempel KOL) ska förutom F17.2 även kod för det skadliga bruket anges med F17.1.	F17.2	

S			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
SARS		J12.8	+ U04.9
Septisk artrit	Septisk artrit i protes	M00.	+T845 +Y883
Sepsis	För kodning av sepsis måste det tydligt framgå av journaldokumentationen att diagnosen är ställd enligt Sepsis-3-kriterierna. R65.1 (Livshotande organdysfunktion som orsakas av ett stort systemiskt svar på infektion) och R57.2 (Septisk chock) används som bidiagnos om patienten har konstaterad sepsis. Kodas i slutenvården och ej på akutmottagningen. Obs, sepsis är ej detsamma som bakterieväxt i blodet! För kodningsexempel se sida 7 i häftet.		
Speciella provtagningar	Ex i kassan, på remiss	Z01.7	AV061
Speciella undersökningar	Ex på remiss	Z01.8	
Sorkfeber	Nephropathia epidemica. Med njurpåverkan	A98.5†	(N80.0*)
	Utan njurpåverkan	A98.8A	
Splenektomerad	Avsaknad av mjälte	D73.0	
Spondylodiskit	Infektion i intervertebraldisk	M46.3	+ EV. B-KOD
Stickskada	Sjukvårdspersonal stucken på kanyl med smittrisk	Z20.	+ W46.2 (ORSAKSKOD)
Stroke i sjukhistorien	Utan sekvele	Z86.7C	
	Med sekvele, till exempel hemipares	G81.9	+I69.3
Suprapubiskateter		Z93.5	
Syrgasbehandling i hemmet		Z99.8	
Sårinfektion	Om sårinfektion i kroniskt ben-/fotsår används alltid L97.		
	Mjukdelsinfektion, ytlig	L02.	Ej kroniskt sår
	Mjukdelsinfektion, underhud	L03.	Ej kroniskt sår
	Trycksår/liggsår	L89.9	+ bokstav för plats
	Postoperativ sårinfektion	T81.4	+ Y88.3 +L02/L03
	Posttraumatisk sårinfektion	T79.3	+ W-KOD + L02/L03/L08.

T			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Tandinfektion	Dental abscess uns	K04.7	
Temporalisartrit		M31.6	
TIA	Akut	G45.9	
Tendinit/tendovaginit uns		M77.9	
Trakeostomi	Blödning/infektion/dysfunktion	J95.0	
Tuberkulos	Olika lokalisationer - se nedan om gravid i slutenvård	A15-A19	
	I skelett och leder	M90.0*	A18.0†
	Utredning TB, negativa provsvar, utan symtom	Z03.0A	+ DV091
	Latent tuberkulos	Z22.7	

	Positivt Quantiferontest	R76.1	
	Gravid med tuberkulos	098.0	
	Insättning av behandling/ordination		DT026+ATC-KOD
	Dosettindelning		DV046
	Smittspårning/miljöundersökning	Z112	AV018 EV. +AV097

U			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Urinvägsinfektion	Övre, akut pyelonefrit, febril uvi, urosepsis	N10.9	
	Pga. KAD	T83.5	+Y84.6+ N10.9 + Z96.0

V			
VAD?	BESKRIVNING	KOD	TILLÄGGSKOD/ÅTGÄRD
Ventrikelshunt	Förekomst av	Z98.2	
Virusexantem		B09.9	
VRE		Z22.3	+ B95.2 + U83.0 + DV091 +EV. AV028

KVÅ – ÅTGÄRDSKODER

VAD?	BESKRIVNING	KOD
Brytpunktssamtal		XV018
CDK, central venkateter för dialys	Inläggning	SP399
CRRT		DR020
CT-ledd punktion av kota		TNA00
Drän	I ex psoasabscess/punktion, av hud/incision av abscess	TQX05
	Buk/lever	TJA40
Extravak hos patient	Hos till exempel track-patient	XV014
Faeceskateter		DJ030
FibroScan		AJ080
Hudbiopsi, inkl. stansbiopsi		TQX00
Injektion av substans i led	(y ersätts - B axel, C armbåge, D handled, F höftled G knäled, H fotled)	TNY11
Ledpunktion	(y ersätts - B axel, C armbåge, D handled, F höftled G knäled, H fotled)	TNY10
Lungscintigrafi		AG04(5–7)
Läkemedelstillförelse (på mott)	Intravenös	DT016 +ATC
	Intramuskulärt	DT011 +ATC
	Subkutant	DT021 +ATC
Nefrostomi	Inläggning av perkutan nefropyelostomi	TKA10
OptiFlow/HFNO		DG028
Palliativ vård		DV097
PEG	Percutan gastrotomi (ditsättande)	JDB10
Peritonealdialys (kronisk)	Används endast inom slutna vård för att markera att patienten under vårdtiden erhållit peritonealdialys	DR024
	Akut	DR023
Pleura-/toraxdrän		TGA30
Port-a-cath, PAC	Anläggning av	TPX10
Pumpstöverbehandling		DP019
Punktion/nålbiopsi av mjukdelar	Byt ut x mot rätt bokstav för mjukdel.	TNX00
Spolning av	Stomi	DJ011
Suprapubiskateter	Perkutan punktion av urinblåsa	DK010
Thoraxdränage	Perkutant inläggande av thoraxdränage	TGA35
TPN	Parenteral nutrition (ex intravenös)	DV055
TEE	Kodas för varje tillfälle	AF064
TTE/Ekokardiografi/UKG	Kodas för varje tillfälle	AF020
Tåtrycksmätning		AP057

Uppstart av behandling		DT026
Vac-behandling av sår		DQ023
Ven/artärbiopsi		TPX00
Ventrikelsond/nasogastrisk sond		TJD00
VSK	Ventrikelsköljning	DJ016
Vårdplanering	SIP	AW013

Bakterier och virus

Streptokocker och stafylokocker	
Streptokocker grupp a, pyogenes, gas	B95.0
Streptokocker grupp b, GBS, agalactiae	B95.1
Streptokocker grupp d, enterokocker till exempel Enterococcus faecium/faecalis	B95.2
Pneumokocker, Streptococcus pneumoniae	B95.3
Andra specificerade streptokocker Ex, grupp g/c, alfastreptokocker, millerigruppen	B95.4
Andra specificerade stafylokocker, ex KNS	B95.7

Andra bakterier	
<ul style="list-style-type: none"> - Pasteurella multocida, - Klebsiella oxytoca, - Moraxella catarrhalis, - Enterobacter cloacae, - Aerogenes, - Bacillus cereus, - Corynebacterium, - Serratia marcescens, - Citrobacter koseri, - Propionibacterium acnes 	B96.8

Övrig information och exempel

Bidiagnoser:

- Inneburit en klinisk utvärdering och bedömning
- Medfört behandling
- Förlängt vårdtiden
- Medfört ökad vårdtyngd
- Utgör riskfaktor
- Varit komplikationer till behandling

Sepsis:

Grundprincip:

1. Koda infektionen först.
2. Lägg därefter till orsakande agens som första diagnos (om det inte ingår i infektionsdiagnosen, ex pneumokockpneumoni).
3. Lägg sist till R65.1 om sjukdomen uppfyller kriterierna för sepsis eller R57.2 för septisk chock. **Observera att dessa diagnoser inte baseras på om positivt blododlingsfynd kan påvisas eller ej.**

Huvuddiagnos:

Vid infektioner ska organinfektionen i första hand anges som huvuddiagnos, till exempel pneumoni, pyelonefrit etc.

När man inte vet var infektionen har sitt ursprung, anges blododlingspositiv sepsis som huvuddiagnos med A40.0 – A41.8 eller annan specifik blododlingsspecifik huvuddiagnos, till exempel meningokocksepsis med A39.2.

A41.9 Sepsis, ospecificerad, bör användas endast vid kliniskt misstänkt sepsis eller septisk chock utan känd bakteriell etiologi.

Exempel 1: Pyelonefrit med växt av E. coli i urin- eller blododling kodas:

N10.9 Akut tubulo-interstitiell nefrit

B96.2 E. coli som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

Exempel 2: Pyelonefrit orsakad av E. coli med sepsis (septisk pyelonefrit)

kodas:

N10.9 Akut tubulo-interstitiell nefrit

B96.2 E. coli som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3 kriterierna

Exempel 3: Pneumokockpneumoni med eller utan växt av pneumokocker i

sputum- eller blododling kodas:

J13.9 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae

Exempel 4: Pneumokockpneumoni med sepsis kodas:

J13.9 Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3 kriterierna

Exempel 5: Patient som har trampat på en spik och ådragit sig sårinfektion

som utvecklats till sepsis kodas:

T79.3 Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras på annan plats

W45.- Främmande kropp som trängt in genom huden

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3 kriterierna

Exempel 6: Urosepsis (utan uppgift om pyelonefrit) då sepsis är dokumenterat enligt Sepsis-3-kriterier kodas:

N39.0 Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna

Exempel 7: Enterokocksepsis utan uppgift om organursprung kodas:

A40.2 Sepsis orsakad av streptokocker grupp D och enterokocker

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna

Exempel 8: Sepsis utan information om organursprung eller orsakande bakterie kodas:

A41.9 Sepsis, ospecificerad

R65.1 Sepsis enligt Sepsis-3-kriterierna

Exempel 9: Septisk chock utan information om organursprung eller utlösande

bakterie kodas:

A41.9 Sepsis, ospecificerad

R57.2 Septisk chock enligt Sepsis-3-kriterierna

Posttraumatisk sårinfektion

Exempel: Patient som söker för sårinfektion på höger häl efter att tidigare ha trampat på en spik. Bedöms som rosfeber, insätts på antibiotika och förbättras snabbt. I odling från såret finner man Staph. aureus och grupp A-streptokocker.

Tidigare skedd skada – nu infektion, i detta fall en erysipelas. Patienten söker inte för själva skadan utan för infektionen som är "posttraumatisk".

- Posttraumatisk sårinfektion T79.3 + Trampat på spik W45.99
- Erysipelas A46.9
- Staph aureus B95.6
- Streptokocker grupp A B95.0

Koden T79.3 anges som första kod vid posttraumatiska infektioner följt av kod som specificerar infektionen. Kod nummer två kan alltså variera beroende på vilken typ av infektion som uppstått. Om patient till exempel fått en cellulit i ett finger efter tidigare kattbett blir kod nummer två L03.0.

Då koden T79.3 är en kod från kapitel 19 måste den åtföljas av en kod från kapitel 20. I exemplet ovan W45.99 för spiktramp

Diabetessår

Vid kodning av **bensår** (L97.9) och samtidig **diabetes** finns särskilda koder för diabetiskt sår:

- Diabetiskt sår (E10.5/E11.5).
- Den "diabetiska foten" (E10.6D/E11.6D).

Graviditet

Vid kodning av gravid kvinna som vårdas p.g.a. **covid-19** och inte sin graviditet, används U07-kod som huvuddiagnos, då det inte finns någon kod i O-kapitlet som hänvisar till U-koder. Detta innebär att principen om O-kod som huvuddiagnos frångås. Graviditeten markeras istället med Z33.9.

- Ex. gravid kvinna som vårdas ineliggande med konstaterad covid-19-infektion kodas med kod för covid-19 först. Lägg dessutom till Z33.9 som bidiagnos för att ange att kvinnan är gravid:
 - o U07.1 Covid-19, virus identifierat
 - o Z33.9 Graviditet UNS
 - o Ev. kod för isolering eller åtgärd

Gravid kvinna som vårdas **ineliggande** för tuberkulos kodas med O98.0 + A-kod.

O98.5 innehåller virussjukdomar som annars hade kodats med A80-B09 och B25-B34.

Malaria kodas med O98.6.

Pneumoni, bronkit, ÖLI och andra lungsjukdomar kodas med O99.5 + J-kod.

Vid kodning av gravid kvinna i **öppenvård** kodas med till exempel hepatit eller HIV med tillägg av Z33.9

Asterisk-daggerkodning i speciella fall

I de flesta fall är ett asterisk-daggerpar tillräckligt för att beskriva vårdkontakten. Det finns dock situationer då man önskar ange att både manifestationen och den bakomliggande sjukdomen har varit föremål för vård och/eller utredning. I dessa fall upprepar man koden för den bakomliggande orsaken (daggerkoden) som bidiagnos till asterisk-daggerparet enligt exemplen nedan. Här exemplifieras också att ett asterisk-daggerpar kan vara bidiagnos om det är relevant.

Exempel: En patient med Parkinsons sjukdom utreds på psykiatrisk klinik för en kognitiv störning. Vid vårdtillfällets slut har man kommit fram till att patienten har demens orsakad av sin neurologiska sjukdom. Under vårdtiden görs även justeringar av patientens medicinering för Parkinsons sjukdom av neurolog.

Huvuddiagnos	Demens vid Parkinsons sjukdom F02.3* G20.9†
Bidiagnos	Parkinsons sjukdom G20.9

I detta exempel har patienten demensutretts vilket och demensen är diagnosen som ställdes vid vårdtillfällets slut. Eftersom även patientens neurologiska sjukdom blev föremål för utredning och behandling anges G20.9 som bidiagnos