

Kodning vid antikoagulantibehandling

När patienter står på antikoagulantia anges koden **Z92.1**.

Tänk på att skriva in under observanda när patienter sätts in på antikoagulantia och likaså att makulera när det sätts ut!

Antikoagulantia som kodas är bl a: Waran, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Marcoumar (Innohep om patienten står på det kontinuerligt).

Kodning av blödning vid antikoagulantibehandling

Vid blödning och samtidig behandling av antikoagulantia där man bedömer att blödningen uppkommit utan att vara orsakad av Waran (eller annan blodförtunnande medicin) men att Waran är en bidragande faktor till blödningens storlek blir blödningen huvuddiagnos. Detta gäller om man tagit Waran enligt ordination.

Kodexempel

Subdural blödning I62.0

Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia D68.3

Biverkan Y57.9 + ATC-kod

Om PK-värde inte är optimalt kodar man även med T50.9 + Y57.9 **om patienten tagit i ordinerad dos** (X44, X64 eller Y14 beroende på om avsiktligt, oavsiktligt eller oklart **om patienten överdoserat**) + ATC-kod.

Om man däremot anser att blödningen är direkt följd av överdosering av Waran blir huvuddiagnosen T50.9 och blödningen blir bidiagnos.