

Läkemedelsintox

Kodexempel läkemedelsintox

Avsiktlig intoxikation med Stesolid:

T50.9 + ATC + X64.99

- **Med känt läkemedelsnamn (ATC):**

T50.9 + ATC + yttre orsakskod (X44 oavsiktligt, X64 avsiktligt, Y14 oklar avsikt eller Y57.9 i terapeutisk bruk enligt ordination)

- **Utan känt läkemedelsnamn**

Leta efter passande kod i avsnitt T36 - T50 + yttre orsakskod (X40 - X49 för oavsiktlig, X60 - X84 avsiktlig, Y10 - Y34 oklar eller Y57.9 i terapeutiskt bruk enligt ordination).

Läkemedelsbiverkan

Kodexempel läkemedelsbiverkan

Förstoppning p g a Citodon:

K59.0 + Y57.9 + ATC

- H-dia Symtom + Y57.9 + ACT

Alkoholintox

- **I berusningssyfte**

F10.0 (ändra texten i journalen till alkoholintox), + Y90 (alkoholhalt) om prov är taget.

- **Alkohol i stora mängder i suicidsyfte**

T51.0 + X65 (avsiktligt) + Y90 (alkoholhalt) om prov är taget.

- **Olyckshändelse (t.ex. barn som druckit likör)**

T51.0 + X45 (oavsiktligt), + Y90 (alkoholhalt) om prov är taget.

- **Antabus (alkoholintox)**

Symtom (kräkning) + Y57.9 + ATC kod + Y90 (alkoholhalt) om prov är taget. Ev F10.2 (ändra texten i journalen till kronisk alkoholism).

För ytterligare information se SoS anvisningar för kodning av bruk/missbruk av alkohol
[Anvisningar för diagnos- och åtgärds kodning med ICD-10-SE och KVÅ \(socialstyrelsen.se\)](https://socialstyrelsen.se/Anvisningar_för_diagnos-och_åtgärds_kodning_med_ICD-10-SE_och_KVÅ)

Intoxikation av droger

F11-F19 (ändra texten i journalen till opiatintox)

F12.0 Spice

Övriga intoxer

Läs i ICD-10-SE under T51-T65