

Remiss för kompressionsprodukter snabbguide

Ange medicinsk indikation för kompressionsbehandling, t ex Venös insufficiens, utläkta bensår, misstanke om/konstaterat lymfödem.

Ange medicinsk kontraindikation eller observanda som utprovare behöver ta hänsyn till.

| Absoluta kontraindikationer | |
|---|---|
| Artärinsufficiens | Ingen kompression om ABI-värde $\leq 0,5$. Ingen kompression utan att kärlkirurg konsulterats. |
| Akut hjärtinsufficiens | Ingen kompression utan att hjärtspecialist konsulterats. |
| Sklerodermi | Pga att underhudsvävnad fibrotiseras och ytlig blodcirkulation försämras. |
| Relativa kontraindikationer eller observanda | |
| Erysipelasinfection | Om trycket tolereras bör patienten fortsätta med tidigare kompression alternativt minska trycket. |
| Allvarlig perifer neuropati | Krävs mycket noggrant anpassad kompression och utvärdering av speciellt erfaren personal. Kompression kan vara kontraindicerat. |
| Cardiellt ödem | Högst knälång strumpa kkl 1. |
| Högt blodtryck, hjärtarytmier, hjärtsvikt, kransartärsjukdom | Kompression kan förvärra beroende på kompressionsklass och produkt. |
| Extrema formavvikelser som djupa hudveck, sår och lymfläckage | Krävs mycket noggrant anpassad kompression och utvärdering av speciellt erfaren personal. |

Vart ska remissen?

- Lymfödem, lipödem → Lymfterapeut hos basenhet Rehab Söder eller Samrehab.
- Venös insufficiens, utläkta bensår → Strumpmottagning i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik beroende på patientens bostadsort.

Remiss giltig i 2 år.

Egenavgift på strumpor tillkommer för patienten.