

## Nivå 1 – Fullt traumateam

## Nivå 2 – Begränsat traumateam

### Fysiologiska kriterier

- Behov av ventilationsstöd
- AF  $<10$  eller  $>29$ 
  - Barn: Andningspåverkan
- BT  $<90$  eller ej palpabel radialispuls
  - Barn: Kapillär återfyllnad  $>2$  s
  - Barn: Puls
    - 0–1 år:  $<90$  eller  $>190$
    - 1–5 år:  $<70$  eller  $>160$
- RLS  $\geq 3$  eller GCS  $\leq 13$

### Anatomiska kriterier

- Penetrerande våld mot hals, huvud, bål, extremiteter ovan armbåge/knä
- Öppen skallskada/impressionsfraktur
- Ansikts-/halsskada med hotad luftväg
- Instabil/deformerad bröstkorg
- Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur
- Misstänkt ryggmärgsskada
- $\geq 2$  frakturer på långa rörben
- Amputation ovan hand / fot
- Stor yttre blödning
- Brännskada  $\geq 18\%$  eller inhalationsskada

### Skademekanism

- Bilolycka  $>50$  km/h utan bilbälte
- Utkastad ur fordon
- Fastklämd med losstagningstid  $>20$  min
- MC-olycka (eller motsvarande)  $>35$  km/h
  - Barn: Påkörd/överkörd av motorfordon
- Fall  $>5$  m
  - Barn: Fall  $>3$  m

### Observandum

Om inga kriterier för traumalarm är uppfyllda, men ett eller flera observandum föreligger, ska detta föranleda kontakt med jourhavande läkare för att prioritera handläggning av patient, anpassa behov av larm eller korrigera larmnivå.

- Successiv försämring av misstänkt allvarligt skadad patient
- Ökad blödningsrisk (antikoagulantia)
- Ålder  $<5$  år eller  $>60$  år
- Allvarlig grundsjukdom
- Hypotermi  $<35^\circ\text{C}$
- Drogpåverkad
- Gravid