

Hej!

Du får denna information då du har en varning för överkänslighet mot penicillin i din patientjournal. Har man en penicillinvarning i journalen förskrivs man oftast mycket bredare antibiotika som har sämre effekt, många fler biverkningar och ibland mycket allvarliga. Hos de som får bred antibiotika ökar även risken för att få resistenta bakterier i påtagligt större omfattning jämfört med de som fått antibiotika som rekommenderas i första hand.

Allvarligare reaktioner på penicillin är mycket ovanliga. Man har kunnat visa att uppemot 90 % av de som tidigare fått varning och testats för allergi mot penicillin inte reagerar längre och varningen kan tas bort.

Det är vanligt att man mår illa, får ont i magen och diarré eller kräks upp medicinen. Man kan få lindrigare hudutslag med eller utan klåda.

Även andra mediciner som man ofta rekommenderar vid infektioner för att sänka febern eller lindra huvudvärk och muskelvärk kan ge problem med magen eller utslag med klåda – t.ex. ibuprofen.

Ofta när man får samma penicillin igen efter en tid, visar det sig att de flesta symtomen som man upplevde tidigare är borta. Det är viktigt att både de som är överkänsliga mot penicillin och de som inte är det får korrekt behandling utifrån det som rekommenderas nationellt. Därför är det mycket angeläget att varningarna i patientjournalen ombedöms/bedöms korrekt utifrån striktare kriterier.

- Patienter som tidigare prick/hudtestats för penicillinallergi och befunnits allergiska - ska inte testas igen.
- Patienter som har fått en prov-dos penicillin och fick allvarlig snabb reaktion – ska inte testas igen.
- Patienter som fått samma typ av penicillin och inte reagerar längre – man kan ta bort varningen.
- Övriga som har reagerat först efter 3 dygns antibiotikaintag kan genomgå en prov-dos testning på hälsocentralen. Man får en full dos eller reducerat dos penicillin och övervakas under 2 timmar. Vid avsaknad av större reaktion tas varningen bort (efter telefonkontakt dagen efter).
- De med reaktion inom 3 dygn remitteras till medicin/barnmedicinklinikerna för utredning med pricktest eller en-dos penicillin provokation.

Har det gått många år och man inte minns hur man har reagerat, bestämmer läkaren den mest trygga handläggningen - testa på hälsocentralen vid låg misstanke om allvarlig reaktion, annars på sjukhuset.