

LOKAL RUTIN FÖR BEREDNING OCH ADMINISTRERING AV INTRAVENÖS ANTIBIOTIKA, ANTIMYKOTIKA OCH ANTIVIRALA LÄKEMEDEL

Observera att dokumentet gäller dosering till vuxna och endast är giltig med godkännande av medicinskt ansvarig läkare.

Av patientsäkerhetsskäl **skall inte** beredd lösning sparas för att ges vid senare tillfälle.

Syfte

Att klarlägga rutiner för beredning och administrering av intravenös antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel.

Omfattning

Region Kalmar län.

Ansvar

Innehållsansvarig: Malin Carnesten, Sjuksköterska infektion, Ola Nordqvist, Apotekare Läkemedelssektionen, Jessica Thulin, Receptarie Läkemedelssektionen.

Godkänd av Viktor Hultqvist, Specialistläkare, infektion.

Rutin

Målgrupp för rutinen är ordinerande läkare, respektive sjuksköterskor som iordningställer och administrerar intravenös antibiotika, antimykotika och antivirala läkemedel.

Aciclovir Pfizer (Aciklovir) Koncentrat till inf.vätska 25 mg/ml 10 ml 20 ml	10 ml (25 mg/ml) späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml. 20 ml (25 mg/ml) späds i 100–250 ml NaCl 9 mg/ml. 20 - 40 ml (25 mg/ml) späds i 250 ml NaCl 9 mg/ml. <i>Efter utspädning skall lösningen skakas.</i> Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min, oavsett dos. <i>Obs! Kärletande!</i>
Geavir Sandoz (Aciklovir) Pulver till infusionsvätska 500 mg	250 mg löses i 10 ml sterilt vatten till en stamlösning med en koncentration på ca 25 mg/ml. <i>Stamlösningen får ej ges outspädd!</i> Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min. 500 mg löses i 20 ml sterilt vatten till en stamlösning till en koncentration på ca 25 mg/ml. <i>Stamlösningen får ej ges outspädd!</i> Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min.
Bensylpenicillin Meda (Bensylpenicillin) Pulver till inj-/inf.vätska 1 g 1,2 g (Panpharma) 3 g	1 g samt 1,2 g löses i 10 ml sterilt vatten. 3 g löses i 20 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under <i>minst</i> 3–5 min. Alternativt: Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml, ges under 20–30 min.
Cefotaxim Navamedic (Cefotaxim) Pulver till inj-/inf.vätska 1 g 2 g	1 g löses i 4 ml sterilt vatten. 2 g löses i 10 ml sterilt vatten. 3 g löses i 15 ml sterilt vatten. * Ges som intravenös injektion under 3–5 min. Alternativt: 2 g späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 50–60 min.
Ceftriaxon Navamedic Pulver och vätska till inj.vätska 1 g Pulver till inf.vätska 2 g	1 g löses i 10 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 5 min. 2 g löses i minst 40 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under minst 30 min. 4 g tillreds genom att använda 2 st. flaskor à 2 g som löses med 40 ml NaCl vardera. Ges som intravenös infusion under minst 30 min.

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Ciprofloxacin Fresenius Kabi (Ciprofloxacin) Infusionsvätska 2 mg/ml 100 ml 200 ml	Färdigblandad infusionsvätska 2 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min. <i>Ljuskänslig!</i>
Clindamycin Hameln (Klindamycin) (Dalacin) Inj-/infvätska 150 mg/ml 4 ml	4 ml (600 mg) späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml. <i>Får ej ges outspädd.</i> Ges som intravenös infusion under minst 20 min.
Cloxacillin Navamedic (Kloxacillin) Pulver till inj-/inf.vätska 1 g 2 g	1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under <i>minst</i> 3-5 min. 2 g löses i 20 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20–30 min. 3 g löses i 20 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20–30 min. <i>Obs! Kärlretande!</i>
Doktacillin (Ampicillin) Pulver till inj-/inf.vätska 1 g 2 g	1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 20 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 3–5 min. 3 g löses i 20 ml sterilt vatten, stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20–30 min.* Alternativt: 1–2 g löses i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20–30 min.
Erythromycin Panpharma (Erytromycin) (Abboticin) Pulver till infusionsvätska 1 g	1 g löses i 20 ml sterilt vatten. (Använd inte NaCl 9 mg/ml till detta steg) <i>Stamlösningen får ej ges outspädd!</i> Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml, kan spädas vidare till 500 ml NaCl 9 mg/ml vid kärlirritation. Ges som intravenös infusion i infusionspump under minst 60 min. <i>Obs! Kärlretande!</i>
Zomylac (Eusaprim) (Trimetoprim + Sulfametoxazol) Infusionskoncentrat 16 mg/ml + 80 mg/ml 5 ml	<i>Får ej ges outspädd!</i> 1 ampull (5 ml) blandas med 250 ml NaCl 9 mg/ml. 2 ampuller (10 ml) blandas med 250 ml NaCl 9 mg/ml. 3 ampuller (15 ml) blandas med 500 ml NaCl 9 mg/ml. Rekommenderad infusionstid är 60 min, max 90 min. <i>Används omedelbart!</i>

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Fluconazol Fresenius Kabi (Flukonazol) Infusionsvätska 2 mg/ml 50 ml 100 ml 200 ml	Färdigblandad infusionsvätska. Infusionshastigheten får ej överstiga 10 ml/min (20 mg/min) hos vuxna. 100 ml (200 mg) infusionstid minst 10 minuter. 200 ml (400 mg) infusionstid minst 20 minuter.
Fortum (Ceftazidim) (Ceftazidim) Pulver till inj-/inf.vätska 1 g 2g	1g eller 2 g löses i 10 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 3–5 min.
Imipenem/Cilastin Fresenius Kabi (Cilastatin + Imipenem) (Tienam) Pulver till infusionsvätska 500 mg	1 st. ampull 500 mg/500 mg löses i 10 ml NaCl 9 mg/ml. Stamlösningen får ej ges utspädd! Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20–30 min. 1 g tillreds genom att använda 2 st flaskor á 500 mg som löses i vardera 10 ml NaCl 9mg/ml. Stamlösningen får ej ges utspädd. Spädes vidare i 250 ml NaCl 9mg/ml. Ges som intravenös infusion under 40–60 min.
Meropenem SUN (Meronem) Pulver till inj-/inf.vätska 500 mg 1 g	500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1 g löses i 20 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 5 min. Alternativt: Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 15–30 min. 2 g tillreds genom att använda 2 st. flaskor à 1 g som löses med 20 ml sterilt vatten vardera och spädes sedan vidare tillsammans i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 30 min.
Metronidazol Braun (Metronidazol) Infusionsvätska 5 mg/ml 100 ml 200 ml 300 ml	Färdigblandad infusionsvätska 5 mg/ml Ges som intravenös infusion i infusionspump med en hastighet av 5 ml/min 100 ml infusionstid 20 min 200 ml infusionstid 40 min 300 ml infusionstid 60 min <i>Ljuskänslig! Skall förvaras i ytterkartong!</i>

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Nebcina (Tobramycin) Injektionsvätska 40 mg/ml 80 mg/ml	<i>Får ej ges utspädd!</i> Ordinerad mängd späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20 – 60 min. OBS! Koncentrationsbestämning bör göras, se doseringsavsnittet på Fass.se.
Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre (Piperacillin + Tazobaktam) Pulver till inj-/inf.vätska 2 g/0,25 g 4 g/0,5 g	2 g/0,25 g löses i 10 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 3–5 min. 4 g/0,5 g löses i 20 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 3–5 min. För att lösa upp, gör enligt följande: 1. Slå lätt med injektionsflaskan för att lossa pulver från botten och sidor 2. Blanda och skaka samtidigt. 3. Skaka tills pulvret är löst. Alternativt: Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20-30 min.
Tavanic (Levofloxacin) Infusionsvätska 5 mg/ml 100 ml	Färdigblandad infusionsvätska 5 mg/ml. 50 ml (250 mg) ges under 30 min. 100 ml (500 mg) ges under 60 min. 150 ml (750 mg) ges under 90 min. <i>Ljuskänslig!</i>
Veklury (Remdesivir) 100 mg	100 mg löses i 19 ml sterilt vatten. 200 mg tillreds genom att använda 2 st. flaskor à 100 mg som löses med 19 ml sterilt vatten vardera och spädes sedan vidare tillsammans. Skaka omedelbart flaskan i 30 sekunder. Låt stå i 2–3 minuter, en klar lösning ska bildas. Om innehållet i flaskan inte är helt upplöst skaka igen i 30 sekunder och låt stå i 2–3 minuter ytterligare. Upprepa denna procedur tills innehållet i flaskan är helt upplöst. Stamlösningen får ej ges utspädd! Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml, vänd sedan påsen försiktigt upp och ner 20 gånger så att lösningen blandas i påsen. Skaka inte. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min. När infusionen är klar, spola med minst 30 ml NaCl.
Vancomycin Orion (Vankomycin) Pulver till infusionsvätska 500 mg 1 g	Skall alltid administreras i infusionspump! OBS! Koncentrationsbestämning bör göras, se doseringsavsnittet på Fass.se. Spädningsschema Vancomycin ↓

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Spädningsschema Vancomycin

500 mg löses i 10 ml sterilt vatten.

1 g löses i 20 ml sterilt vatten.

Stamlösningen späds ytterligare enligt detta schema.

Infusionshastigheten får ej överstiga 10 mg/minut.

Vancomycin	Späds	Total vätskemängd inkl stamlösning	Tid	Hastighet i droppräknare
500 mg	100 ml NaCl	110 ml	50 min	132 ml/h
600 mg	250 ml NaCl	262 ml	60 min	262 ml/h
700 mg	250 ml NaCl	264 ml	70 min	226 ml/h
800 mg	250 ml NaCl	266 ml	80 min	199 ml/h
900 mg	250 ml NaCl	268 ml	90 min	179 ml/h
1000 mg	250 ml NaCl	270 ml	100 min	162 ml/h
1100 mg	250 ml NaCl	272 ml	110 min	148 ml/h
1200 mg	250 ml NaCl	274 ml	120 min	137 ml/h
1300 mg	500 ml NaCl	526 ml	130 min	243 ml/h
1400 mg	500 ml NaCl	528 ml	140 min	226 ml/h
1500 mg	500 ml NaCl	530 ml	150 min	212 ml/h
1600 mg	500 ml NaCl	532 ml	160 min	199 ml/h
1700 mg	500 ml NaCl	534 ml	170 min	188 ml/h
1800 mg	500 ml NaCl	536 ml	180 min	179 ml/h
1900 mg	500 ml NaCl	538 ml	190 min	170 ml/h
2000 mg	500 ml NaCl	540 ml	200 min	162 ml/h

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

SPECIALSORTIMENT

Amikacin Macure (Biklin) Injektionsvätska 250 mg/ml 2 ml	2 ml (500 mg) späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml. 4 ml (1000 mg) späds i 250 ml NaCl 9 mg/ml. <i>Stamlösningen får ej ges outspädd.</i> Ges som intravenös infusion i infusionspump under 30 - 60 min. OBS! Koncentrationsbestämning bör göras.
AmBisome (Amfotericin B) 50 mg	50 mg löses i 12 ml sterilt vatten. Skaka omedelbart flaskan under 30 s. Stamlösningen späds vidare i glukoslösning (får ej spädas med NaCl), till önskad koncentration (0,2–2 mg/ml). Följ instruktionen på Fass.se. Använd det bifogade filtret. Ges som intravenös infusion under 30–60 min.
Artesunate Amvias (Artesunate) Pulver och vätska till inj.vätska Substans 110 mg	Varje flaska löses genom att dra upp 11 ml av den medföljande natriumfosfatbufferten och tillsätt till flaskan med Artesunate 110 mg, snurra försiktigt (skaka inte) upp till 5–6 min till pulvret är helt löst och inga synliga partiklar syns. Injicera som en långsam intravenös bolusdos under 1–2 minuter.
Azactam (Aztreonam) Pulver till inj-/inf.vätska 1 g 2 g	1 g löses i 10 ml sterilt vatten. 2 g löses i 20 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 3–5 min. Alternativ: 1–2 g löses i 10 ml sterilt vatten. Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 20–60 min.
Azitromax (Azitromycin) 500 mg	500 mg infusionssubstans, löses i 4,8 ml sterilt vatten. Flaskan skakas tills allt pulver är löst. Stamlösningen späds i 500 ml NaCl 9 mg/ml, ger ca 1 mg/ml. Rekommenderad infusionstid är för 1 mg/ml är 3 timmar För koncentration 2 mg/ml späds stamlösningen i 250 ml NaCl 9 mg/ml. Rekommenderad infusionstid är för 2 mg/ml är 1 timme.
Cefuroxim (Zinacef) 750 mg 1500 mg	750 mg löses i 10 ml sterilt vatten. 1500 mg löses i 20 ml sterilt vatten. Alternativt: Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml, ges under 30–60 min.

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Cresemba (isavukonazol) Pulver till infusionsvätska 200 mg	200 mg löses i 5 ml sterilt vatten till en stamlösning med koncentrationen 40 mg/ml. Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min. Vid infusion använd ett filter porstorlek 0,2µm-1,2µm
Cymevene (Ganciklovir) Pulver till infusionsvätska 500 mg	<i>Potentiellt teratogent och karcinogent! Hanteras med försiktighet!</i> 500 mg löses i 10 ml sterilt vatten. <i>Stamlösningen får ej ges utspädd!</i> Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min.
Daptomycin Reddy (Cubicin) Pulver till injektions-/infusionsvätska <i>Skall förvaras i kylskåp!!</i>	350 mg löses i 7 ml NaCl 9 mg/ml vilket ger en koncentration på 50 mg/ml. Tillsätt natriumkloriden långsamt utefter innerväggen och rotera flaskan försiktigt. Låt stå i 10 minuter. Roter flaskan försiktigt några minuter tills en klar lösning erhålls. Ges som intravenös injektion under 2 minuter. För 700 mg ta 2 flaskor Daptomycin och tillsätt 7 ml NaCl 9mg/ml i vardera flaskan. För 1050 mg ta 3 flaskor Daptomycin och tillsätt 7 ml NaCl 9mg/ml i vardera flaskan. För 1400 mg ta 4 flaskor Daptomycin och tillsätt 7 ml NaCl 9mg/ml i vardera flaskan. Alternativt: Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 30 min. OBS! Sterilt vatten får inte användas vid beredning av stamlösning!
Doxyferm (Doxycyklin) Infusionskoncentrat 20 mg/ml 5 ml	5 ml (100 mg) späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 30 - 120 min. 10 ml (200 mg) späds i 250 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion under 30 - 120 min.
Ecalta (Anidulafungin) Pulver till infusionsvätska 100 mg <i>Skall förvaras i kylskåp!</i>	100 mg löses i 30 ml sterilt vatten, Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 90 min. 200 mg löses i 60 ml sterilt vatten, Stamlösningen späds vidare i 200 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 180 min.

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Ertapenem Fresenius Kabi (Invanz) Pulver till infusionsvätska 1 g	Stamlösning: 100 mg/ml: 1g pulver löses i 10 ml sterilt vatten. <i>Omskakas väl.</i> Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 30 min.
Fetcroja (Cefiderokol) Pulver till infusionsvätska 1 g	2 gram tillreds genom att använda 2 flaskor á 1 gram, som löses med vardera 10 ml NaCl 9 mg/ml som tas ur en 100 ml påse. Skaka försiktigt för att lösa upp pulvret. Injektionsflaskan ska få stå tills skummet som bildats på ytan har försvunnit (vanligen 2 minuter) Volymen av den beredda lösningen i injektionsflaskan blir ca 11,2 ml. Tillsätt sedan hela mängden från flaskorna till återstoden av 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 180 min. Ljuskänslig
Gensumycin Sanofi (Gentamicin) Injektionsvätska 40 mg/ml 2 ml	Ges som intravenös injektion under 3-5 min. Obs! Koncentrationsbestämning bör göras, se doseringsavsnittet på Fass.se Alternativt: Dosen gentamicin späds i 100 ml NaCl 9 mg/ml, ges som intravenös infusion under 30 min.
Linezolid Accord (Zyvoxid) Infusionsvätska 2 mg/ml 300 ml	Färdigblandad infusionsvätska 2 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 30-120 min.
Kaspofungin Lorient (Cancidas) (<u>Caspofungin</u>) Pulver till infusionsvätska 50 mg 70 mg	Låt injektionsflaskan anta rumstemperatur. 50 mg eller 70 mg löses i 10,5 ml sterilt vatten. <i>Stamlösningen får ej ges outspädd.</i> Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min.
Moxifloxacin Krka Infusionsvätska 400mg/250ml 400 mg	Färdigblandad infusionsvätska, 250 ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min. <i>Ljuskänslig!</i>

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Rifadin (Rifampicin) Pulver och vätska till inf.vätska 600 mg	600 mg löses i 10 ml sterilt vatten (medföljer eventuellt) Stamlösningen späds vidare i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 3 timmar.
Tadim (Kolistimetat) Pulver till inf.vätska	1 miljon internationella enheter löses i 4 ml NaCl 9 mg/ml. Stamlösningen späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml.* 3 miljon internationella enheter löses i 20 ml NaCl 9 mg/ml. Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9 mg/ml.* Ges som intravenös infusion i infusionspump under 30 min.
Targocid (Teikoplanin) Pulver till inj-/inf.vätska 200 mg 400 mg	200 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. 400 mg löses i 3,2 ml sterilt vatten. Ges som intravenös injektion under 3-5 min. Vattnet tillsätts långsamt till flaskan. För att undvika skumbildning roteras flaskan tills allt pulver är upplöst. Om det bildas skum bör vätskan stå i ca 15 min så att skummet försvinner.
Tygacil (Tigecyklin) Pulver till inf.vätska 50 mg	50 mg löses i 5,3 ml NaCl 9 mg/ml. Injektionsflaskan ska roteras försiktigt. 5 ml (=50 mg) lösning dras omedelbart upp (<i>Stamlösningen får ej ges outspädd</i>), och spädes vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. 100 mg tillreds genom att använda 2 st. flaskor à 50 mg som löses med 5,3 ml NaCl 9 mg/ml vardera och sedan späds vidare tillsammans i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 30 min.
Vfend (Vorikonazol) Infusionssubstans 200 mg	Stamlösning: Tillsätt 19 ml sterilt vatten till 200 mg infusionssubstans. Ordinerad volym späds vidare till 250 ml NaCl. Slutlig koncentration 0,5-5 mg/ml. Infusionstid: 60 – 120 min. Infusionshastighet får inte överskrida 3 mg/kg/timme. Se FASS för mer detaljerad instruktion!

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07

Zerbaxa (Ceftolozan/Tazobaktam) Pulver till inf.vätska 1 g/0,5 g	1 g/0,5 g ceftolozan/tazobactam löses i 10 ml sterilt vatten. Omskakas. <i>Stamlösningen får ej ges outspädd!</i> Stamlösningen (ca 11,4 ml) späds vidare i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Den slutliga volymen är cirka 111,4 ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 min.
Zinfo (Ceftarolinfosamil) Pulver till inf.vätska 600 mg	600 mg löses i 20 ml sterilt vatten. Skaka före spädning av stamlösning. Stamlösningen späds vidare i 250 ml NaCl 9mg/ml. Ges som intravenös infusion i infusionspump under 60 minuter.
Xydalba (Dalbavancin) Pulver till inf.vätska 500 mg	500 mg löses i 25 ml sterilt vatten. Lösningen i flaskan (25 ml) för 500 mg spädes vidare i 250 ml Glucos 50 mg/ml ger en koncentration på 1,8 mg/ml. 1000 mg tillreds genom att använda 2 st 500 mg som löses i vardera 25 ml sterilt vatten. Lösningen i flaskorna (50 ml) för 1000 mg spädes vidare i 250 ml Glucos 50 mg/ml ger en koncentration på 3,3 mg/ml. 1500 mg tillreds genom att använda 3 st 500 mg som löses i vardera 25 ml sterilt vatten. Lösningen i flaskorna (75 ml) för 1500 mg spädes vidare i 250 ml Glucos 50 mg/ml ger en koncentration på 4,6 mg/ml. Tillsätt det sterila vattnet långsamt utefter innerväggen i injektionsflaskan. Skummar! Roter flaskan försiktigt, skaka inte! Samtliga styrkor ges som intravenös infusion i infusionspump under 30 minuter.

Datum	Ändring	Utförd av

* Beredningsanvisning saknas enligt tillverkaren (FASS 2016). Beredningen ska godkännas av respektive verksamhetschef.

Informationssäkerhet: K R T

Referens:

Ett utskrivet dokumentets giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2025-04-07