

Guide för antikoagulantibehandling – kontroll och dosering

Vägledning kontrollintervall krea/eGFR

Förutsättning är att doseringen är anpassad i enlighet med Fass.

- 12 månader Eliquis, Xarelto, Lixiana vid eGFR \geq 30 ml/min
- 12 månader Pradaxa eGFR \geq 50 ml/ min.
- 6-12 månader Pradaxa eGFR 30-49 ml/min.
- 6 månader Eliquis eGFR 15-29ml/min. Kan fortsätta efter individuell bedömning, om stabil eGFR.

	Eliquis (apixaban)	Lixiana (edoxaban)	Pradaxa (dabigatran)	Xarelto (rivaroxaban)
Dosering	5 mg 1x2	60 mg 1x1	150 mg 1x2 Men överväg 110 mg 1x2 om minst ett av följande: -ålder 75-80 år, -GFR 30-50 ml/min -esofagit, reflux, gastrit -ökad blödningsrisk	20 mg 1x1
OBS				Tas med mat
Dosjustering	2,5 mg 1x2 om 2 av följande -ålder \geq 80 år -vikt \leq 60 kg -krea \geq 133 μ mol/l eller om eGFR 15-29 ml/min (individuell bedömning)	30 mg 1x1 om något av -GFR 30-50 ml/min -vikt \leq 60 kg - samtidig behandling med ciklosporin, dronaderon, erytromycin eller ketokonazol	110 mg 1x2 om -ålder \geq 80 år eller -samtidig behandling med verapamil	15 mg 1x1 om -GFR 30-50 ml/min
Samtidig behandling med dronedaron	Fungerar	Dosanpassning	Kontraindicerat	Rekommenderas inte
GFR 15-29 ml/min	Ej nyinsättning men kan ev fortgå om stabil GFR	Rekommenderas inte	Kontraindicerat	Rekommenderas inte
GFR \leq 15 ml/min	Samtliga NOAK kontraindicerade, välj warfarin med lägre startdos och tätare kontroll			
Krossbart	Ja	Ja	Nej	Ja
Dosdispensering	Ja	Ja	Nej	Ja