

Checklista

FÖR BEHANDLING MED DENOSUMAB (PROLIA)

Gäller för: Region Kalmar län

Ansvariga: Terapigrupp Osteoporos

Personnummer _____

Namn _____

Övrigt _____

Ordinationsdatum _____ Läkare _____

Provtagning 1-2 veckor före varje planerad behandling (S-kalcium jon och P-kreatinin med GFR).

Provtagning även 2 veckor efter första behandling (S-kalcium jon och P-kreatinin) för att utesluta hypokalcemi.

Risken för hypokalcemi är högre vid GFR < 30 ml/min. Om GFR > 30 ml/min behövs ej uppföljande provtas efter kommande Prolia-injektioner (observera att GFR < 30 ml/min inte utgör en kontraindikation för Prolia-injektion, men alltså kräver skärpt observans avseende hypokalcemiutveckling)

Normalt värde S-kalcium jon

Kalk- och/eller D-vitaminbehandling

Pågår eller planeras invasiv tandvård? Ja Nej

Allergier? Ja Nej

Kallelse och patientinformation skickad till patienten

Prolia injektionsvätska 60 mg rekviderat till enheten

Behandlingsdatum _____

Patienten utrustad med telefonnummer till sjuksköterska/mottagning

Nästa behandling (6 mån +/- 3 v efter föregående) _____