

Vårdenheter i Hälsoval
Sjuksköterskor i Kalmar läns kommuner

Ordination enligt generellt direktiv gällande vaccin mot pneumokocker

Gäller för _____

(Enhetens namn, inklusive kommunens sjuksköterskor inom området)

Vaccin

Pneumovax

Dos

0,5 ml, injektion **intramuskulärt eller subkutant**. Revaccination minst 5 år efter senaste dosen.

Indikation

Att administrera läkemedel enligt generellt direktiv innebär att sjuksköterska först gjort en bedömning av patientens behov av läkemedlet, samt beaktat indikation, kontraindikation(er) och observanda.

Riskgrupper med ökad risk som rekommenderas vaccination

- Personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:
 - kronisk hjärtsjukdom
 - kronisk lungsjukdom
 - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation
 - kronisk leversjukdom
 - kronisk njursjukdom
 - diabetes mellitus
- Personer som är 65 år eller äldre
- Personer som haft invasiv pneumokockinfektion
- Personer som röker
- Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
- Svetsares

Riskgrupper med mycket hög risk omfattas inte

Detta generella direktiv omfattar inte personer med mycket hög risk:

(stamcellstransplanterade, bristande mjältnfunktion eller saknar mjälte, cystisk fibros, likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen, cochleaimplantat, nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, genomgången

organtransplantation). Individuell ordination krävs. Annat vaccin kan vara aktuellt beroende på patientens vaccinationsstatus. Viktigt dock att fånga upp dessa patienter och hänvisa till rätt vårdinstans för vaccination (se bilaga 1). Kontrollera uppmärksamhetsinformationen i NPÖ innan vaccinering med Pneumovax.

Kontraindikationer

- **Överkänslighet mot något av vaccinetts beståndsdelar.** Vid tidigare svår allergisk reaktion av vaccination får beslut om vaccination endast tas av patientansvarig läkare.

Observanda

- Vaccination ska senareläggas hos individer med **akut allvarlig febersjukdom eller akut infektion**. Förekomst av lindrig infektion och/eller lågradig feber utgör inte skäl för att senarelägga vaccination.
- För personer med mycket hög risk för invasiv pneumokocksjukdom se ovan.

Patienter med blodförtunnande läkemedel

Se Läkemedelskommitténs riktlinje (bilaga 2). Lokal kompression av injektionsstället rekommenderas under **fem minuter** efter given intramuskulär vaccination.

Dokumentation

Dokumentation sker i MittVaccin enligt Region Kalmar läns Riktlinje för ordination och dokumentation av vaccination (bilaga 3). Vaccinationen som omfattas av detta generella direktiv ska rapporteras till Nationella vaccinationsregistret, NVR. MittVaccin rapporterar automatiskt de personer som fyller 75 år i år. I övriga fall dyker det upp en fråga om personen tillhör riskgrupp som omfattas av det nationella särskilda programmet eller inte och då ska denna besvaras med "ja". Se bilaga 1 och 3.



Lisa Labbé Sandelin
Smittskyddsläkare

Basenhetschef

Medicinskt Ledningsansvarig läkare

Bilagor

- Bilaga 1 Riktlinje för pneumokockvaccination
Bilaga 2 Riktlinje för vaccination vid behandling med antikoagulantia
Bilaga 3 Riktlinje för ordination och dokumentation av vaccination