



جمع البول لمدة 24 ساعة بحمض الهيدروكلوريك. ملحق: معلومات عن حمض 5-هيدروكسي إندول أسيتيك

تعليمات أخذ العينات لـ tU-5-HIA و fS-5-HIA

القيود الغذائية

يجب ألا تستهلك أياً مما بالأسفل يومين قبل أو أثناء جمع العينات:

يمكن للأغذية التي تحتوي على السيروتونين أن تعطي نتائج عالية بشكل خاطئ لحمض 5-هيدروكسي إندول أسيتيك. أمثلة على ذلك:

- الأناناس
- الباذنجان
- الأفوكادو
- الموز
- الجريب فروت
- جبن العفن الأخضر
- المكسرات
- البرقوق
- النبيذ الأحمر
- الطماطم

كما يمكن أن تؤثر الأدوية التالية على نتيجة القياس:

- إيمبرامين، ليفودوبا، وميثيل دوبا حيث أنها تمنع إنتاج حمض 5-هيدروكسي إندول أسيتيك في الجسم.
- نابروكسين.
- أدوية السعال مثل Theracough و Nipenesin.

في حالة الانتظام في تناول أي من هذه الأدوية يجب عليك استشارة الطبيب الذي وصف الفحص بخصوص احتمالية الانقطاع عن الدواء قبل الفحص.