


Vårdförlopp suicid, fas 1, psykiatri öppenvård och heldygnsvård: Suicidnära patienter

Samma dag



* Dokumenteras i den dynamiska mallen "Suicidriskbedömning" i Cosmic

- SUICIDRISKBEDÖMNING***
Underlag för bedömning
- Samtal från remittent
 - [Suicidstege och skattningsskalor](#)
 - [Risknivåer](#)
 - [Risk- och skyddsfaktorer](#)
 - Om möjligt involvera närstående
 - För patienter under 18 år, kontakta alltid vårdnadshavare

- Inför utskrivning, gå igenom följande med patienten:
- Aktuella kontaktuppgifter till patient/anhöriga/närstående
 - Informera om telefonuppföljning och vem man kontaktar om patienten inte svarar.
 - Ta kontakt med anhöriga/närstående. Ge dem kontaktuppgifter till vården
 - Var restriktiv vid förskrivning av läkemedel. Förskriv gärna små förpackningar
 - Vid itererade recept, ange expeditionsintervall
 - När antidepressiv behandling påbörjas, var uppmärksam på ökad suicidrisk de första veckorna.
 - Om det finns barn i hemmet, bedöm om en orosanmälan behöver göras
 - Bestäm hur en uppföljning görs och av vem
 - Om patienten inte kommer på bokad tid ska ansvarig behandlare aktivt kontakta patienten eller närstående