

Rutiner vid sondmatning (vuxna)

Lokala rutiner

- Kontakt ska tas med dietismottagningen så fort som möjligt när man tar beslut om enteral nutrition, helst innan behandlingen påbörjas.
- Dokumentera vikt och längd i Cosmic inom 24 timmar efter inskrivning (under sökorden kroppsvikt och längd).
- Patientens vikt ska regelbundet följas upp under vårdtiden för att kunna reglera energitillförsel efter aktuellt behov. Rekommendation att ta vikt 2 gånger per vecka.
- Ordination av sondnäring ska göras i läkemedelslistan i Cosmic (av dietist eller läkare).
- I de fall sondmatning påbörjas innan dietist har gjort en bedömning av energi- och näringsbehovet rekommenderas i första hand sondmaten Fresubin 2 kcal HP fibre. Läkare kan lägga till sondnäringen på läkemedelslistan.
- Dokumentera beslut och anledning/orsak till avsteg i Cosmic. Vid sondmatning och minst 30 minuter efter avslutad tillförsel bör huvudändan vara höjd minst 30 grader. Detta gäller även 30 minuter efter avslutad tillförsel. Det allra bästa är om patienten kan vara uppesittande.
- Vid nasogastrisk sond, kontrollera sondens läge innan matning genom "kurr ljud" alternativt aspiration av magsaft eller genom röntgen.
- Sonden ska noggrant spolats igenom med 20-50 mL rumstempererat vatten innan och efter matning.

Upptrappning

Påbörja sondmatning enligt Vårdhandbokens rekommendationer (se tabellerna nedan). Ge inte större volym än 1000 ml per dygn innan dietist har gjort en bedömning av energi- och näringsbehovet.

Sondläge i ventrikeln		
Dag 1	25-50 mL/tim	Totalt 250-500 mL
Dag 2	50-150 mL/tim	Totalt 500-1000 mL
Dag 3	100-200 mL/tim	Totalt 750-1500 mL
Om patienten inte bedöms vara undernärdd och inte har varit fastande i mer än tre dygn kan man prova en snabbare tillförsel med en större volym från början, gärna genom intermittent matning eller bolusmatning.		
För patienter med långvarig svält (>7 dygn), med uttalad metabol stress eller som haft längre tarmvila under parenteral nutrition, bör upptrappning ske långsamt. Initialt kan det vara motiverat med en mycket låg tillförsel med hastighet exempelvis 15-20 mL/tim.		

Sondläge i duodenum/jejunum		
Dag 1	20 mL/tim	Totalt 100-250 mL
Dag 2	40 mL/tim	Totalt 250-500 mL
Dag 3	60 mL/tim	Totalt 500-750 mL
Dag 4	80 mL/tim	Totalt 750-1000 mL
Dag 5	100 mL/tim	Totalt 1000-1250 mL

Vid tillförel direkt i tarmen bör sondmatningspump användas. Tillförel av sondnäring bör ske försiktigare, gärna långsamt och kontinuerligt. Matningshastigheten får maximalt vara **125 mL/tim**, vilket är ungefär samma hastighet som magsäcken normalt tömmer sig.

Läkemedelshantering

Se länk nedan.

Hygienhantering

- Handdesinfektion är viktig vid allt arbete med sond, sondmatningsaggregat och sondnäring.
- Använd nytt aggregat/sondspruta (lila) vid varje matningstillfälle.
- Öppnad sondnäring som stått i rumstemperatur mer än 4 timmar skall kasseras.
- Sondmatspåse som ges kontinuerligt kan hänga i 24 timmar om den inte kopplas från patienten. Så fort den kopplas från patienten gäller 4 timmar.
- I dagsläget utgör Fresenius-Kabis EasyBag ett undantag. Öppnad EasyBag kan förvaras i rumstemperatur (15-25 grader Celsius) i 24 timmar från öppnandet. Nytt aggregat krävs efter avbrott i sondmatningen.

Beställning av sondnäring och tillbehör

Beställning sker via Raindance.

Sondnäring	Fresubin 2 kcal HP fibre	Artikelnr: 101789
Aggregat	Aggr sondnär vux-barn portabel Compat Ella spike set ENFit s	Artikelnr: 102791
Spruta	Spruta eng 20 ml enteral/oral lila KD-JECT E ENFit s	Artikelnr: 102342
Spruta	Spruta eng 60 ml enteral/oral lila KD-JECT E ENFit s	Artikelnr: 102343

Sondmatningspump beställs till avdelningen via Kund- och förskrivarportalen alternativt via hjälpmedelsverksamhetens kundtjänst på telefon 010-358 72 20.

Ytterligare information

För ytterligare information om enteral nutrition hänvisar vi till Vårdhandboken www.vardhandboken.se

- Översikt: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/oversikt/>
- Ansvarsfördelning: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/ansvarsfordelning/>
- Bedömning av behov och utvärdering: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/bedomning-av-behov-och-utvardering/>
- Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/administrationsvagor-skotselrad-och-omvardnad/>
- Tillbehör: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/tillbehor/>
- Val av sondnäring: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/val-av-sondnaring/>
- Tillförsel av sondnäring: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/tillforsel-av-sondnaring/>
- Läkemedelstillförsel: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/lakemedelstillforsel/>
- Komplikationer: <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/komplikationer/>