

- Med BTT bedöms förekomst av visuospatialt neglekt.
- Baking Tray Task-brickan placeras på ett bord med långsidan mot patienten.
- Brickans centrumlinje och kroppens medellinje skall sammanfalla.
- Lådan med kuber placeras utanför brickans borte långsida så att även dess centrumlinje sammanfaller med brickans.

Instruktionen till patienten är:

"Tänk dig att du lägger bullar på en bakplåt och fördela samtliga de här kuberna så jämt som möjligt på brickan du har framför dig".

"Tala om när du är klar med uppgiften".

Ingen tidtagning görs. Kubernas placering på brickan markeras på särskilt protokoll.

Då instrumentet togs fram fanns svårigheter att hitta tröskelvärden därav finns det ingen gradering i lätt eller måttligt utan en eventuell avvikelse – dysfunktion observeras och sedan görs en kvalitativ summering.

Om patienten har rörelsebegränsning måste det beaktas vid bedömning av resultatet.

Referenser:

Appelros P, Karlsson G, Thorvalls A, Tham K, Nydevik I (2004). Unilateral Neglect: Further Validation of the Baking Tray Task. Journal of Rehabilitation Medicine nr 36: 258-261.

Tham K, Tegnér R (1996). The Baking Tray Task: A Test of Spatial Neglect. Neuropsychological Rehabilitation, 6: 19-25.