




Vuxna med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom




Rutiner för vaccination

- Behandlande läkare identifierar vaccinationsbehov för personer med mycket hög risk. Remiss krävs för vaccination på Infektionsmottagningen och Medicinmottagningen i Västervik
- Patienter med aspleni, hypospleni eller likvorläckage ska även vaccineras mot meningokocker och ska därför vaccineras via Infektionsmottagningen i Kalmar eller Medicinmottagningen i Västervik. Vid planerad splenektomi bör den sista vaccinationen ha getts minst två veckor före operation. Revaccination med Pneumovax sker i primärvården, patienten måste själv boka tid för detta. Se även [Vaccination till splenektomerade - Vårdgivare Region Kalmar län](#)
- Stamcellstranplanterade följer särskilt schema (minst 3 doser Apexxnar, ej Pneumovax) och sköts via Infektionsmottagningen i Kalmar eller Medicinmottagningen i Västervik.
- Patienter med nedsatt immunförsvar, cochleaimplantat, cystisk fibros eller organtransplantation vaccineras via Infektionsmottagningen i Kalmar, Medicinmottagningen i Västervik eller i förekommande fall via hemmakliniken. Revaccination med Pneumovax sker i primärvården, patienten måste själv boka tid för detta.

Barn 2-17 år med **mycket hög risk** för allvarlig pneumokocksjukdom

Rapporteras till Nationella Vaccinationsregistret, NVR

- **Aspleni, hypospleni** (splenektomerade, bristande mjältfunktion, planerad splenektomi)
- **Likvorläckage** (likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen)
- **Nedsatt immunförsvar** (stamcells- eller benmärgstransplanterade följer eget schema) (hematologisk cancer, sicklecellanemi, lungcancer, vissa andra personer med nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling efter individuell bedömning.)
- **Organtransplantation**
- **Cochleaimplantat**
- **Cystisk fibros**



Rutiner för vaccination

- Ordination sker alltid via barnklinik. Vaccinet kan ges i primärvården efter överenskommelse, säkerställ att rätt vaccin finns att tillgå.
- Apexxnar är inte godkänt för barn.

Barn från 2 års ålder och vuxna med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Rapporteras till Nationella Vaccinationsregistret, NVR

- **Kronisk hjärtsjukdom**
- **Kronisk lungsjukdom** (t.ex. KOL, svår astma)
- **Nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation** (t. ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar, extrem fetma, Mb Down)
- **Kronisk leversjukdom**
- **Kronisk njursvikt** (t.ex. nefrotiskt syndrom)
- **Diabetes mellitus**
- **Personer det år de fyller 75 år ***

Rapporteras inte till NVR

- Personer som **haft invasiv pneumokockinfektion**
- Personer som är **65 år eller äldre**
- Personer med **alkohol- eller narkotikaberoende**
- Personer som **röker**
- **Svetsare**

Ovaccinerad vuxen

1 dos (0,5 ml)
Pneumovax

Fått en eller flera doser **Pneumovax**

Ovaccinerat barn
(ej följt allmänna barnvaccinationsprogrammet)

Barn < 6 år:
1 dos **Vaxneuvance** följt av en dos **Pneumovax** två månader senare.
Barn ≥ 6 år bara en dos **Pneumovax**.

Barn som fått en eller flera doser **Synflorix** eller **Prevenar 13**
(följt allmänna barnvaccinationsprogrammet)

1 dos (0,5 ml)
Pneumovax tidigast 2 månader efter **Synflorix** eller **Prevenar 13**

Revaccination med **Pneumovax** minst 5 år efter senaste dos.

Rutiner för vaccination

- Vaccination och revaccination sker i primärvården, patienten måste själv boka tid för revaccination.
- Vid vaccination av barn sker ordination alltid via barnklinik. Vaccinet kan ges i primärvården efter överenskommelse, säkerställ att rätt vaccin finns att tillgå.
- Sprututbytesdeltagare vaccineras via Infektionsmottagningen i Kalmar.

*Gäller personer födda 1947 eller senare. Om en person inte blir vaccinerad året då den fyller 75 år ska vaccinationen erbjudas vid en senare tidpunkt.