

Allmänt

För mottaglighet, inkubationstid, symtom, provtagning, vaccination, antibiotikabehandling och profylax var god se PM på Smittskyddets hemsida. Viktigaste åtgärden för att undvika smitta från vårdpersonal är kunskap om att hosta kan vara kikhosta. Låg tröskel för provtagning vid hosta och vaccination av personal som vårdar spädbarn är andra förebyggande åtgärder.

Smittspridning

- Huvudsakliga smittvägen är droppsmitta men kan även spridas som kontaktsmitta
- Smittsamheten minskar på > 1 m avstånd

Smittfrihet

- Smittsamheten är som högst de första 2-3 veckorna men kan föreligga ända upp till 6 veckor.
- Smittsamheten minskar efter 2 dygns antibiotikabehandling

Smittspårning

- Syftar till att hitta exponerade barn under 1 år, gravida i 3 e trimestern och vårdpersonal.
- Omfattningen av smittspårningen avgörs i samråd med Vårdhygien

Var ska patienten vårdas

- Eget rum med egen toalett och stängd dörr

Vårdrutiner

- Arbeta utifrån basala hygienrutiner
- Vid patientnära arbete (< 1 m) används andningsskydd FFP3 i kombination med visir

Personal

- Gravid personal i 3e trimestern bör inte vårda patient med smittsam kikhosta
- Vårdpersonal som arbetar med spädbarn rekommenderas vaccination. Gäller även städpersonal.

Städning, tvätt, avfall, disk

Punktdeinfektion Ytdeinfektion

Daglig städning Toalett och tagytor - fuktad mikrofiberduk alt. rengöringsmedel och vatten därefter ytdeinfektion.
Golv- fuktad mikrofibermopp alt. rengöringsmedel och vatten

| | |
|---------------------|---|
| Slutstädning | Vanlig slutstädning Fuktad mikrofiberduk alternativt allrengöring och vatten. Ytdesinfektionsmedel på tagytor. Golv - fuktad mikrofibermopp alt. rengöringsmedel och vatten. |
| Tvätt | Konventionell tvätt |
| Avfall | Konventionellt avfall |
| Disk | Använt porslin diskas direkt. Använd bricka tas direkt ut till diskmaskin. |